

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
FUCITHALMIC 10 MG/G AUGENGEL

FUSIDINSÄURE (WASSERFREI)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibungs- erhältlich. Um einem bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Fucithalmic jedoch vorschriftsgemäss angewendet werden.

- Heben Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einem Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Fucithalmic 10 mg/g Augengel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Fucithalmic 10 mg/g Augengel beachten?
3. Wie ist Fucithalmic 10 mg/g Augengel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fucithalmic 10 mg/g Augengel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST FUCITHALMIC 10 mg/g Augengel UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Augengel, welches ein Antibiotikum enthält.

FUCITHALMIC wird bei mikrobiellen Infektionen des vorderen Auges angewendet.

FUCITHALMIC kann beispielsweise bei Infektionen der Augenbindehaut (Konjunktivitis), Infektionen der Augenlider, Augenlidgeschwüren, Infektionen der Tränenkanäle oder der Hornhaut angewendet werden.

Wenden Sie sich an einen Augenarzt, wenn Sie an der Diagnose zweifeln.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FUCITHALMIC 10 mg/g Augengel, BEACHTEN?

FUCITHALMIC darf nicht angewendet werden

- Wenn Sie empfindlich (allergisch) gegen Fusidinsäure oder eine der anderen Bestandteile von FUCITHALMIC sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von FUCITHALMIC ist erforderlich

- denn wie bei allen Antibiotika besteht ein Risiko auf eine neue Infektion mit nicht empfindlichen Keimen. In diesem Fall muss die Behandlung mit FUCITHALMIC beendet werden.
- wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Das Tragen von Kontaktlinsen muss während der Behandlung vermieden werden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn eine der oben genannten Warnungen auf Sie zutrifft oder in der Vergangenheit zutreffen hat.

Bei Anwendung von FUCITHALMIC mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medikamente einnehmen oder kürzlich eingenommen haben, auch wenn es Medikamente sind, die nicht verschreibungspflichtig sind.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei Anwendung von FUCITHALMIC zusammen mit Lebensnahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

FUCITHALMIC muss während der Schwangerschaft mit Vorsicht angewendet werden.

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
FUCITHALMIC 10 MG/G AUGENGEL

FUSIDINSÄURE (WASSERFREI)

FUCITHALMIC muss während der Stillzeit mit Vorsicht angewendet werden.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie ein Medikament einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

FUCITHALMIC verändert die Sehschärfe nicht und darf von Personen angewendet werden, die ein Fahrzeug und/oder Maschinen führen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteilen von FUCITHALMIC

FUCITHALMIC enthält als Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kann Augenirritationen hervorrufen. Das Tragen von Kontaktlinsen muss während der Behandlung vermieden werden.

3. WIE IST FUCITHALMIC 10 mg/g Augengel ANZUWENDEN?

Wenden Sie Fucithalmic immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die normale Dosis ist ein Tropfen FUCITHALMIC alle 12 Stunden, aufgetragen auf der Innenseite des unteren Augenlids.

Wenn vom Arzt nichts anderes vorgeschrieben ist, muss die Behandlung bis zu 2 Tagen nach dem Verschwinden der Symptome der Infektion fortgesetzt werden.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn sich die Symptome verschlechtern oder nach 5 Tagen noch nicht verbessert haben.

Die nächsten Schritte nach der Gabe von Augentropfen, nützlich für die systemische Absorption zu verringern:

- Das Augenlid geschlossen halten für 2 Minuten;
- Der Tränenkanäle mit dem Finger geschlossen halten für 2 Minuten

Wenn Sie eine größere Menge von FUCITHALMIC angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel FUCITHALMIC angewendet/ingenommen haben, sollten Sie sich sofort an Ihren Arzt, Apotheker oder den Giftnotruf (070/245 245) wenden.

Die Tatsache, dass das Produkt in einer kleinen Tube geliefert wird, macht eine Überdosierung unwahrscheinlich.

Wenn Sie die Anwendung von FUCITHALMIC vergessen haben

Tragen Sie dann bei der nächstmöglichen Gelegenheit die normale Menge auf.

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Behandlung mit FUCITHALMIC abbrechen

Wenn Sie die Behandlung nicht vollendet haben, ist es möglich, dass die Infektion nicht heilt oder wiederkehrt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann FUCITHALMIC Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die häufigsten Nebenwirkungen nach der Anwendung von FUCITHALMIC sind Reaktionen an der Anwendungsstelle: vorübergehendes gereiztes und brennendes Gefühl. Juckreiz, Ausschlag, Urtikaria (Nesselsucht), periorbitales Ödem, Ödem infolge einer allergischen Reaktion (Angio-Ödem) und Verschlechterung der Konjunktivitis (Bindehautentzündung) wurden auch gemeldet.

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
FUCITHALMIC 10 MG/G AUGENGEL

FUSIDINSÄURE (WASSERFREI)

Es können allergische Reaktionen (wie Bindehautentzündung, Hornhautentzündung, Ekzem der Augenlider, Ekzem um das Auge) auftreten.

Informieren Sie bitte bei Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST FUCITHALMIC 10 mg/g Augengel AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Verwenden Sie FUCITHALMIC nicht mehr nach dem Datum auf der Verpackung bei den Anfangsbuchstaben EX. (Monat/Jahr). Die Abkürzung EX. bedeutet, dass das Medikament am letzten Tag des Monats, der nach der Abkürzung angegeben ist, verfällt. Dieses Datum darf nicht überschritten werden.

Nicht länger als einen Monat nach Öffnung der Tube verwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Wenden Sie sich für alle Informationen bezüglich dieses Medikaments an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können sich auch an den Inhaber der Registrierung wenden:

Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland
Tel No. +44 (0)870 777 7675
Fax. No. +44 (0)870 7770 7875
Email: medinfo@amdipharm.com

Was FUCITHALMIC enthält

Der Wirkstoff ist Fusidinsäure (Wasserfrei) 10 mg/g

Die sonstigen Bestandteile sind Benzalkoniumchlorid, Natriumedetat, Mannitol, Carbomer, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionen.

Wie FUCITHALMIC aussieht and Inhalt der Packung

Tube von 5 g Augengel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Inhaber der Registrierung:
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland

Hersteller:
LEO Laboratories Ltd.
P.O. Box 81
Cashel Road 285
Dublin 12
Irland

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
FUCITHALMIC 10 MG/G AUGENGEL

FUSIDINSÄURE (WASSERFREI)

Registriernummer:
BE144654

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 02/2015.