

## **Trippler/ Gonorrhö Behandlung (Azithromycin + Suprax)** **Zusätzliche Informationen zur Behandlung von Gonorrhö**

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über die Verwendung von Azithromycin und Suprax (Cefixim) zur Behandlung von Gonorrhö.

Bevor Sie Azithromycin und Suprax (Cefixim) zur Behandlung von Gonorrhö verwenden, lesen Sie bitte dieses Infoblatt sowie die Beipackzettel für jedes der beiden Medikamente. Die Beipackzettel finden Sie hier:

Azithromycin:

<https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Beipackzettel/AZITHROMYCIN-HEXAL-500-mg-Filmtabletten-1038447.html>

Suprax (Cefixim):

<https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Beipackzettel/CEFIXIM-STADA-200-mg-Filmtabletten-5124072.html>

Wir raten von der Entsorgung dieses Informationsblattes ab, da Sie es gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal benötigen.

**Bitte beachten Sie, dass die Antibiotika in Tablettenform nicht die Erstlinientherapie zur Behandlung von Gonorrhö sind.** Die Erstlinientherapie zur Behandlung von Gonorrhö besteht aus einer Injektion in Kombination mit der Einnahme einer Azithromycin Tablette. Diese Art von Behandlung kann jedoch nur von einem Arzt verabreicht werden.

**Aufgrund der weitverbreiteten Antibiotikaresistenz werden die oral verabreichten Antibiotika zur Behandlung von Gonorrhö nur Personen verabreicht, die nicht in der Lage sind, die Erstlinientherapie zu bekommen.**

In diesem Informationsblatt finden Sie die folgenden Informationen:

1. Was ist Gonorrhö?
2. Wie wirken die Medikamente, die in der Gonorrhö Behandlung enthalten sind?
3. Was Sie wissen sollten, bevor Sie die Behandlung verwenden
4. Wie sind die Medikamente einzunehmen?
5. Weitere Informationen

## **1. Was ist Gonorrhö**

Gonorrhö, auch bekannt als Tripper, ist eine sexuell übertragbare Infektion. Sie kann durch ungeschützten vaginalen, analen oder oralen Geschlechtsverkehr oder durch die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeugen übertragen werden.

Eine Gonorrhö Infektion führt nicht immer zu merklichen Symptomen. Tatsächlich haben rund 10% aller Männer und 50% aller Frauen keinerlei Symptome.

Sollten Sie Symptome verspüren, können dies beispielsweise eines oder mehrere der folgenden sein:

- Schmerzen beim Urinieren
- Unterleibsschmerzen
- Weißer, Gelber oder grüner Ausfluss aus Penis oder Scheide
- Zwischenblutungen oder verstärkte Regelblutungen bei Frauen
- Schwellung der Vorhaut oder Hodenschmerzen bei Männern

In seltenen Fällen können sich Personen außerdem in den Augen, im After oder im Hals infizieren.

Wenn Sie annehmen, dass Sie eventuell in Kontakt mit der Infektion gekommen sein könnten, sollten Sie sich schnellstmöglich testen lassen - auch, wenn Sie keinerlei Symptome zeigen. Wenn Gonorrhö unbehandelt bleibt, kann dies schwere Folgen haben, wie beispielsweise Unfruchtbarkeit.

## **2. Wie wirken die Medikamente, die in der Gonorrhö Behandlung enthalten sind?**

Gonorrhö wird durch Bakterien verursacht. Antibiotika wirken, indem sie genau diese Bakterien, die für die Infektion verantwortlich sind, abtöten. Dies tun sie, indem sie die Bakterien davon abhalten, bestimmte Arten von Proteinen zu produzieren, welche sie benötigen, um zu wachsen und um sich zu vermehren.

Sobald die Antibiotika dies geschafft haben, sind die Bakterien nicht mehr in der Lage, sich zu vermehren und das Immunsystem des Körpers kann die Überreste der Bakterien abtöten. Die Symptome (falls es welche gab) beginnen dann, zu verschwinden.

Diese Tripper/ Gonorrhö Behandlung enthält zwei verschiedene Arten von Antibiotika. Einige Bakterien können sich weiter entwickeln und antibiotika resistent werden. Aus diesem Grund werden zur Behandlung zwei Arten von Antibiotika verschrieben, damit die Infektion korrekt behandelt werden kann.

### **3. Was Sie wissen sollten, bevor Sie die Tripper/ Gonorrhö Behandlung verwenden**

Bitte lesen Sie die Beipackzettel beider Medikamente.

Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie an anderen Erkrankungen leiden, damit Ihr Arzt feststellen kann, ob die Antibiotika zur Behandlung einer Gonorrhö Infektion problemlos von Ihnen verwendet werden können.

Im Idealfall sollten Sie sich direkt bei Ihrem Arzt testen und entsprechend des Testergebnisses behandeln lassen.

Die BASHH Richtlinien sagen aus, dass die Erstlinientherapie für Gonorrhö in Großbritannien eine Injektion in Kombination mit einer Tablette ist. Diese Injektion kann jedoch nur von einem Arzt verabreicht werden.

In dem von uns angebotenen Gonorrhö Kit sind oral einzunehmende Tabletten enthalten. Diese werden als Zweitlinientherapie empfohlen, wenn jemand die Injektion nicht verabreicht bekommen kann oder möchte.

Oral einzunehmende Antibiotika können außerdem verschrieben werden, wenn jemand zwar ein positives Testergebnis hat, jedoch nicht zu seinem oder ihrem Arzt gehen kann.

Die BASHH Richtlinien (2011) für diese Art von Gonorrhö Behandlung raten zu der Verwendung von 1 g Azithromycin (in Kombination mit Cefixim oder Suprax). Diese Gonorrhö Behandlung enthält 2 g Azithromycin im Einklang mit den Europäischen Richtlinien für Gonorrhö Behandlung, die im Jahr 2012 veröffentlicht wurden.

Wenn Sie schwere Nebenwirkungen nach der Einnahme erfahren, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt.

#### **4. Die Einnahme des Gonorrhö Kits**

Nehmen Sie diese Medikamente wie von Ihrem Arzt verschrieben ein.

Zur Behandlung einer Gonorrhö Infektion wird meist folgendes verschrieben:

- 400 mg (2 x 200 mg Tabletten) Suprax (Cefixim)
- und 2 g (4 x 500 mg Tabletten) Azithromycin.

Schlucken Sie die Tabletten im Ganzen mit etwas Wasser.

Trinken Sie 48 Stunden vor der Einnahme sowie 48 Stunden nach der Einnahme keinen Alkohol.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Tabletten wie verschrieben einnehmen. Wenn Sie die Tabletten nicht wie verschrieben einnehmen, kann es sein, dass Sie nicht ausreichend wirken und die Infektion nicht ausreichend behandelt wird.

Diese Antibiotika wurden Ihnen persönlich verschrieben. Sie sollten sie nicht an andere Personen weitergeben.

Vor der Einnahme der Tripper/ Gonorrhö Behandlung sollten Sie außerdem die Beipackzettel beider Medikamente lesen.

#### **5. Weitere Informationen**

Sie sollten auf Geschlechtsverkehr verzichten, bis Sie einen erneuten Test gemacht haben, der negativ ausgefallen ist. Den Test sollten Sie zwei Wochen nach der Einnahme der Medikamente machen.

Wenn Sie sich testen lassen wollen, wenden Sie sich am besten an Ihren Frauenarzt, Urologen oder Hausarzt.

Es ist wichtig, dass Sie die Personen über Ihre Infektion informieren, mit denen Sie in der Zeit vor Ihrer Diagnose Geschlechtsverkehr hatten, damit diese sich ebenfalls testen lassen können.

Sollten Sie weitere Informationen zum Thema Gonorrhö oder Gonorrhö Behandlung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.