

Notice : Information de l'utilisateur

Diprosone® 0,5 mg/g crème
Diprosone® 0,5 mg/g pommade
Diprosone® 0,5 mg/g solution pour application cutanée
dipropionate de bétaméthasone

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Diprosone et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Diprosone
3. Comment utiliser Diprosone
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Diprosone
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Diprosone et dans quel cas est-il utilisé

Diprosone contient du dipropionate de bétaméthasone, un stéroïde.

Diprosone est utilisé pour traiter les problèmes inflammatoires de la peau.

La solution pour application cutanée s'utilise sur le cuir chevelu ou les autres zones du corps présentant des poils épais.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Diprosone

N'utilisez jamais Diprosone

- si vous êtes allergique (hypersensible) au dipropionate de bétaméthasone ou à l'un des autres composants contenus dans Diprosone (mentionnés à la rubrique 6)
- si vous avez des ulcères au niveau de la peau
- sur une plaie
- sur une peau infectée
- sur une peau atteinte d'acné
- près des yeux.

Faites attention avec Diprosone

Consultez votre médecin avant d'utiliser Diprosone :

- si vous devez utiliser le médicament de manière prolongée ou sur une surface étendue
- si votre peau est fine ou abîmée
- si vous utilisez le médicament sous un pansement occlusif
- si vous êtes un enfant.

Veillez consulter votre médecin avant d'utiliser Diprosone si l'une des situations mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin avant d'utiliser Diprosone si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, en particulier si vous devez l'utiliser de manière prolongée ou l'appliquer sur une surface étendue. Vous devez le faire car seul votre médecin est capable de décider si vous pouvez utiliser Diprosone pendant la grossesse ou l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de Diprosone

- Diprosone crème contient du chlorocrésol. Peut provoquer des réactions allergiques.
- Diprosone crème contient de l'alcool cétostérylique. Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

3. Comment utiliser Diprosone

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Diprosone est exclusivement destiné à une application sur la peau.

Comment utiliser Diprosone

- Utilisez Diprosone deux fois par jour, matin et soir.
- Appliquez une fine couche de Diprosone pour recouvrir complètement la (les) zone(s) à traiter.
- Massez légèrement pour faire pénétrer le médicament dans la peau et lui permettre d'agir correctement.
- Lavez vos mains après avoir appliqué Diprosone.

Combien de temps devez-vous utiliser Diprosone ?

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Diprosone. Cela dépendra des résultats obtenus. Le traitement sera arrêté dès la guérison de la peau affectée.

- Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.
 - N'utilisez pas Diprosone pendant plus de 2 semaines sauf si votre médecin vous dit de le faire.
- Suivez toujours les recommandations de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de Diprosone que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de Diprosone ou si vous en avez avalé accidentellement (prudence avec les enfants), prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

Les symptômes d'un surdosage sont similaires à ceux observés en cas d'applications trop fréquentes ou prolongées de Diprosone (voir rubrique « 4. Quels sont les effets indésirables éventuels »). Les symptômes sont réversibles. Si nécessaire, votre médecin devra restaurer l'équilibre de ce qu'on appelle « les électrolytes » dans votre corps, afin de favoriser le contrôle de l'équilibre des liquides de votre corps.

Si vous oubliez d'utiliser Diprosone

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser Diprosone

Lorsque vous arrêtez le traitement, vos problèmes de peau peuvent réapparaître.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Diprosone peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Réactions allergiques

Si vous avez une réaction allergique, arrêtez l'utilisation de Diprosone et consultez immédiatement votre médecin.

Diprosone est généralement bien toléré. Néanmoins, vous pouvez présenter les problèmes suivants au niveau de la peau :

- acné
- vergetures
- infections de la peau
- problèmes de peau autour de la bouche
- coloration anormale ou amincissement de la peau
- inflammation de la racine des poils, croissance anormale des poils
- sensation de brûlure, démangeaisons, irritation, sécheresse ou rougeur de la peau (« dermatite de contact ») – si votre peau devient irritée, arrêtez l'utilisation de Diprosone.

Comme c'est le cas avec les autres stéroïdes, l'application de Diprosone sur une surface étendue, en quantités importantes, de manière prolongée ou sous un pansement occlusif, peut causer l'absorption d'une quantité plus élevée de stéroïdes à travers la peau. Cela peut provoquer des effets indésirables généraux aux stéroïdes tels qu'un gonflement du visage, du cou et du tronc ou une prise de poids. Chez les enfants, la croissance peut être altérée. Consultez votre médecin si vous présentez ces effets indésirables.

Les enfants, les patients ayant une peau fine ou endommagée et les patients souffrant d'affections graves du foie sont plus sensibles aux effets indésirables.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver Diprosone

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Diprosone crème : ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Diprosone pommade : à conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Diprosone solution pour application cutanée : à conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas utiliser pendant plus de 3 mois après l'ouverture.

Ne pas utiliser Diprosone après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après {EXP}. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient Diprosone

Diprosone crème

- La substance active est le dipropionate de bétaméthasone 0,64 mg/g (ce qui équivaut à 0,5 mg/g de bétaméthasone).
- Les autres composants sont : chlorocrésol, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, acide phosphorique, paraffine blanche molle ; paraffine liquide, cétomacrogol 1000, alcool céstéarylique, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Diprosone pommade :

- La substance active est le dipropionate de bétaméthasone 0,64 mg/g (ce qui équivaut à 0,5 mg/g de bétaméthasone).
- Les autres composants sont : paraffine liquide et paraffine blanche molle.

Diprosone *solution pour application cutanée* :

- La substance active est le dipropionate de bétaméthasone 0,64 mg/g (ce qui équivaut à 0,5 mg/g de bétaméthasone).
- Les autres composants sont : carbomère, hydroxyde de sodium, alcool isopropylique, eau purifiée.

Qu'est-ce que Diprosone et contenu de l'emballage extérieur

Diprosone crème : tubes en aluminium tubes de 5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 50 , 100 et 500 g.

Diprosone pommade : tubes de 10 , 15, 20, 30, 50, 100 et 500 g.

Diprosone solution pour application cutanée : flacons de 15 , 20 , 25 , 30 , 50, 100 ,250 et 300 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

MSD Belgium BVBA/SPRL

Lynx Binnenhof 5

Clos du Lynx 5

B-1200 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tel: 0800 38 693

+32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Fabricant :

Diprosone crème et Diprosone pommade : NV Schering-Plough Labs, Industriepark 30. B-2220 Heist-op-den-Berg.

Diprosone solution pour application cutanée : NV Schering-Plough Labs, Industriepark 30. B-2220 Heist-op-den-Berg ou Schering-Plough S.A., 2 rue Louis Pasteur, F-14200 Hérouville-St-Clair.

Numéros d'autorisation de mise sur le marché :

BE033354 (Diprosone crème)

BE033336 (Diprosone pommade)

BE106443 (Diprosone solution pour application cutanée)

Contactez votre médecin ou votre pharmacien concernant toute information relative à ce médicament.

Médicament soumis à prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2013.