



Accueil | Glossaire | Aide

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr]

Dernière mise à jour le 25/03/2016

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

SOMMAIRE

Description médicament
Informations
Utilisation
Effets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

LARIAM 250 mg, comprimé sécable - Notice patient



ANSM - Mis à jour le : 17/04/2015

Dénomination du médicament

LARIAM 250 mg, comprimé sécable
Méfloquine

Encadré

Vous devez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament contient de la méfloquine. Il appartient à une famille de médicaments appelés les antipaludiques qui agissent en détruisant le parasite responsable du paludisme.

Le paludisme est une maladie causée par un parasite, transmise par la piqûre d'un moustique vivant en zone tropicale. Cette maladie peut être très grave. Il faut tout faire pour s'en protéger et elle doit être dépistée et traitée rapidement.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour la prévention du paludisme.

Il est indispensable de consulter un médecin pour connaître la conduite à tenir pour la prévention du paludisme la plus adaptée à votre projet de voyage, même si vous avez déjà pris LARIAM pour un précédent voyage dans la même région ou une autre partie du monde.

Ce médicament est également utilisé pour traiter des crises (accès) de paludisme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais LARIAM 250 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la méfloquine ou à l'un des autres composants contenus dans Lariam. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6 « Informations supplémentaires ».
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les antipaludiques) comme la quinine ou la quinidine.
- Si vous prenez ce médicament pour éviter d'attraper le paludisme et que vous avez ou avez eu dans le passé une dépression, une anxiété généralisée (névrose d'angoisse caractérisée par une inquiétude excessive difficilement contrôlable), des idées de suicide et un comportement de mise en danger de soi-même, une schizophrénie, une psychose (perte de contact avec le réel) ou tout autre trouble psychiatrique.

- Si vous prenez ce médicament pour éviter d'attraper le paludisme et que vous avez déjà eu une crise d'épilepsie ou des convulsions.
- Si vous avez eu dans le passé une complication du paludisme affectant le sang et les reins (fièvre bilieuse hémoglobinurique).
- Si vous avez un défaut de fonctionnement du foie grave (insuffisance hépatique sévère).
- Si vous prenez en même temps un médicament contenant de l'halofantrine, utilisé pour traiter le paludisme. Vous ne devez pas prendre de médicament contenant de l'halofantrine si vous prenez ou avez pris Lariam au cours des 15 dernières semaines (voir ci-dessous « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).
- Si vous prenez en même temps un médicament contenant de l'acide valproïque utilisé contre l'épilepsie, ou du valpromide utilisé en psychiatrie (voir ci-dessous « Prise ou utilisation d'autres médicaments »)

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

Faites attention avec LARIAM 250 mg, comprimé sécable

Prévenez votre médecin avant de prendre Lariam si vous avez ou si vous avez eu dans le passé des troubles psychiatriques comme une dépression, une tentative de suicide ou autres... (voir ci-dessus « Ne prenez jamais LARIAM 250 mg, comprimé sécable »). Dans ce cas, ce médicament peut ne pas être adapté à votre situation et doit être remplacé par un autre médicament pour prévenir le paludisme.

Lariam peut entraîner des troubles neuropsychiatriques graves chez certains patients. Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets suivants pendant le traitement avec Lariam :

- Comportement inhabituel ou changement inhabituel de l'humeur
- Cauchemars, rêves anormaux, insomnies
- Confusion mentale
- Troubles de l'attention
- Dépression
- Anxiété sévère ou attaque de panique
- Agitation, nervosité, agressivité (sentiment de colère nouveau ou aggravé)
- Idées suicidaires ou comportement de mise en danger de soi-même
- Sentiments de défiance envers autrui (paranoïa),
- Psychose (perte de contact avec la réalité)
- Vision ou bruit des choses qui n'existent pas (hallucinations)

Veillez consulter immédiatement un médecin si vous ressentez ces troubles neuropsychiatriques pendant le traitement avec Lariam. Lariam doit être immédiatement arrêté et votre médecin reconsidèrera votre traitement.

Avant de prendre Lariam, prévenez également votre médecin si vous avez ou avez eu par le passé :

- Une réaction allergique à Lariam ou à l'un de ses composants.
- Une crise d'épilepsie ou des convulsions.
- Des problèmes cardiaques, comme des troubles du rythme cardiaque.
- Des problèmes hépatiques ou rénaux.
- Une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Dans ce cas, vous ne devez pas prendre Lariam.
- Une diminution du taux de glucose dans le sang fréquente ou permanente due à une affection préexistante appelée hyperinsulinisme congénital.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre Lariam. Votre médecin décidera si vous devez être traité(e) par ce médicament et s'il est nécessaire de vous surveiller étroitement.

Lariam peut entraîner d'autres effets indésirables potentiellement graves. Si vous ressentez un des effets suivants, vous devez consulter immédiatement un médecin :

- Une réaction allergique à Lariam ou à l'un de ses composants grave (anaphylaxie) avec des symptômes comme une difficulté à respirer, un gonflement de la langue, un œdème, des démangeaisons et une éruption cutanée importante.
- Une crise d'épilepsie ou des convulsions.
- Des problèmes cardiaques, comme des troubles du rythme cardiaque, incluant des palpitations (sensations que le cœur bat très vite) ou un pouls irrégulier.
- Une éruption cutanée ou rougeur étendue accompagnée de cloques ou d'un décollement de la peau (desquamation), plus particulièrement autour de la bouche, dans la gorge, du nez, des parties génitales (ulcères) ou des yeux (conjonctivites) et potentiellement associée à des symptômes pseudo grippaux incluant de la fièvre. Ces signes peuvent être évocateurs d'une affection potentiellement grave appelée syndrome de Stevens Johnson.
- Une inflammation des poumons se manifestant par une difficulté à respirer, une toux, généralement associés à une fièvre ou des frissons et potentiellement des maux de tête. Il pourrait s'agir d'une inflammation des poumons potentiellement d'origine allergique grave et potentiellement mortelle.
- Un foie sensible, dur ou augmenté de volume, un ictère (jaunissement de la peau/des yeux), des urines foncées, des selles décolorées et des démangeaisons généralisées. Ces symptômes peuvent potentiellement traduire un grave problème au foie.
- Dysfonctionnement, insuffisance ou inflammation du rein révélé généralement lors d'un examen sanguin et pouvant éventuellement se traduire par une diminution du volume des urines, une altération de l'état général, une tension artérielle anormale, ou encore des douleurs abdominales ou lombaires.

- Une pancréatite (inflammation du pancréas) pouvant se manifester par des symptômes tels que des douleurs à l'estomac ou des douleurs abdominales.
- Une neuropathie avec des signes tels que des fourmillements ou des picotements, un engourdissement, une douleur, une sensation de brûlure, une faiblesse musculaire, l'apparition ou l'aggravation de troubles de l'équilibre ou des tremblements au niveau des mains et des doigts.
- Un trouble visuel.
- Si vous prenez ce médicament pour traiter une crise de paludisme et que vous observez une aggravation des signes de la maladie.

Les effets indésirables peuvent survenir pendant le traitement mais aussi après que vous ayez arrêté de prendre Lariam, parfois même plusieurs mois après l'arrêt. Chez quelques patients, il est rapporté que les troubles neuropsychiatriques tels qu'une dépression, des vertiges ou encore des pertes d'équilibre peuvent persister plusieurs mois voire plus longtemps, même après l'arrêt du traitement (voir la mise en garde au paragraphe « Conduite de véhicules et utilisation de machines » de cette même rubrique).

Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et LARIAM 250 mg, comprimé sécable

Ne prenez pas LARIAM si vous prenez un médicament contenant de l'halofantrine utilisé pour traiter le paludisme ou contenant de l'acide valproïque utilisé contre l'épilepsie, ou du valpromide utilisé en psychiatrie (voir ci-dessus « Ne prenez jamais LARIAM 250 mg, comprimé sécable ») et prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Dites à votre médecin ou à votre pharmacien si :

- si vous prenez du fingolimod utilisé dans la sclérose en plaque
- si vous prenez de la quinine, ou encore de la quinidine ou de la chloroquine, utilisés pour traiter ou prévenir le paludisme.
- si vous prenez un médicament bêtabloquant ou antagoniste du calcium utilisé pour traiter des problèmes cardiaques ou une pression artérielle élevée, un antidépresseur ou un neuroleptique utilisé pour traiter certains troubles psychiatriques,

si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, si vous êtes enceinte ou souhaitez le devenir, il est fortement déconseillé de voyager dans les zones où vous risquez d'attraper le paludisme, en raison de la gravité de cette maladie.

La méfloquine passe dans le lait maternel. En conséquence, par mesure de précaution, vous devez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Soyez prudent. Ne conduisez pas sans avoir lu cette notice.

Ce médicament peut provoquer des étourdissements, des vertiges, des pertes de l'équilibre, des troubles touchant les nerfs et/ou des troubles neuropsychiatriques. Ces troubles peuvent survenir lors de la conduite de véhicules, de l'utilisation de machines ainsi qu'aux cours d'activités ou de certains sports nécessitant une attention soutenue, une coordination fine des mouvements (exemple pilotage d'avions, alpinisme, plongée...). Ils peuvent apparaître très tardivement même jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement et persister longtemps. Des étourdissements, des vertiges et des pertes de l'équilibre pouvant persister plusieurs mois voire plus longtemps, même après l'arrêt du traitement ont été rapportés chez quelques patients.

Si vous ressentez l'un de ces effets au cours du traitement, il est déconseillé de conduire un véhicule, d'utiliser une machine ou d'exercer une activité ou un sport nécessitant une attention soutenue ou une coordination fine des mouvements.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de LARIAM 250 mg, comprimé sécable : ce médicament contient un sucre, le lactose (voir ci-dessus « Faites attention avec LARIAM 250 mg, comprimé sécable »).

3. COMMENT PRENDRE LARIAM 250 mg, comprimé sécable ? ↴

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous prenez ce médicament pour éviter d'attraper le paludisme (prévention) :

- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 45 kilogrammes (kg) :

la posologie recommandée est de 1 comprimé par semaine en une seule prise,

- Chez l'adulte et l'enfant dont le poids est compris entre 15 et 45 kg (soit pour l'enfant, un âge compris entre environ 3 et 15 ans) :

la posologie recommandée est de 5 mg par kg de poids corporel par semaine en une seule prise.

Soit à titre indicatif :

- de 31 à 45 kg : 3/4 (trois quarts) de comprimé par semaine en une seule prise;
- de 20 à 30 kg : 1/2 (un demi) comprimé par semaine en une seule prise;
- de 15 à 19 kg : 1/4 (un quart) de comprimé par semaine en une seule prise.

- Chez l'enfant de moins de 15 kg :

En l'absence de données cliniques, il convient d'éviter l'utilisation de ce médicament chez les enfants de moins de 15 kg.

Quand devez-vous commencer le traitement par LARIAM ?

Afin de s'assurer que la prise de LARIAM est bien tolérée avant le départ dans la zone où vous risquez d'attraper le paludisme, il est recommandé de prévoir la première prise 10 jours avant le départ et la deuxième prise 3 jours avant le départ. Les prises suivantes se feront toutes les semaines à jour fixe.

Quand devez-vous arrêter le traitement par LARIAM ?

La dernière prise aura lieu au moins 3 semaines après le retour de la zone où vous risquez d'attraper le paludisme.

Si vous prenez ce médicament pour traiter une crise (accès) de paludisme :

Vous devez consulter immédiatement un médecin si vous ressentez les effets suivants car il pourrait s'agir d'une crise de paludisme : une fièvre, des frissons, un malaise général.

La dose recommandée pour traiter une crise de paludisme est de 25 mg par kg de poids corporel. Cette dose doit être administrée en 2 à 3 prises réparties sur 24 heures.

Soit à titre indicatif :

- Si vous pesez plus de 60 kg* : 6 comprimés par jour, soit :
 - 3 comprimés,
 - puis 2 comprimés 6 à 8 heures plus tard,
 - puis 1 comprimé 6 à 8 heures plus tard.
- Si vous pesez de 46 kg à 60 kg : 5 comprimés par jour, soit :
 - 3 comprimés,
 - puis 2 comprimés 6 à 8 heures plus tard.
- Si vous pesez de 31 kg à 45 kg : 3 à 4 comprimés par jour, soit :
 - 2 à 3 comprimés,
 - puis 1 comprimé 6 à 8 heures plus tard.
- Si vous pesez de 21 kg à 30 kg : 2 à 3 comprimés à prendre en 2 prises à 12 heures d'intervalle.
- Si vous pesez de 5 kg** à 20 kg : 1/4 (un quart) de comprimé pour 2,5 kg de poids corporel ou 1 comprimé pour 10 kg de poids corporel à répartir en 2 prises à 12 heures d'intervalle.

**Aucune donnée n'est disponible pour l'administration de doses supérieures à 6 comprimés chez des patients de poids très important.*

***En l'absence de donnée chez les nourrissons de moins de 3 mois ou pesant moins de 5 kg, il conviendra d'éviter l'utilisation de LARIAM en traitement d'une crise de paludisme dans cette tranche d'âge.*

Si, malgré une dose correcte, le traitement par LARIAM n'entraîne pas d'amélioration dans les 48–72 heures, **consultez rapidement un médecin.**

Si les signes de votre maladie persistent ou s'aggravent, n'augmentez pas le nombre de prises mais consultez immédiatement un médecin.

Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. LARIAM a un goût amer et légèrement piquant.

Les comprimés doivent être avalés sans les croquer avec un verre de liquide, de préférence au cours d'un repas.

Chez l'enfant de moins de 6 ans ainsi que chez les personnes ayant des difficultés pour avaler, les comprimés peuvent être écrasés et dissous dans de l'eau.

Les comprimés sont sécables. Cela signifie que vous pouvez également les casser en deux ou en quatre parts égales si nécessaire.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de LARIAM 250 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre LARIAM 250 mg, comprimé sécable : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↗

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Lariam peut entraîner des troubles neuropsychiatriques graves ou des effets indésirables potentiellement graves chez certains patients.

→ **Lisez impérativement la description des signes d'appels figurant à la rubrique 2 au paragraphe « Faites attention avec LARIAM 250 mg, comprimé sécable » et informez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un de ces effets pendant le traitement avec Lariam.**

Attention : certains effets indésirables peuvent survenir ou persister jusqu'à même plusieurs mois après l'arrêt de LARIAM. Chez quelques patients, il est rapporté que certains troubles neuropsychiatriques, tels qu'une dépression, des étourdissements, des vertiges ou encore des pertes d'équilibre peuvent persister plusieurs mois voire plus longtemps, même après l'arrêt du traitement.

Effets indésirables très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10) :

- Troubles du sommeil (cauchemars, rêves anormaux, insomnies).

Effets indésirables fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 100 mais moins de 1 personne sur 10) :

- Anxiété.
- Dépression.
- Etourdissements.
- Maux de tête.
- Troubles de la vue.
- Pertes de l'équilibre (vertiges).
- Nausées.
- Diarrhée.
- Douleur au ventre (douleur abdominale).
- Vomissements.
- Démangeaisons.

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Idées suicidaires et comportement de mise en danger de soi-même.
- Sentiments de défiance envers autrui (paranoïa)
- Vision ou bruit de choses qui n'existent pas (hallucinations),
- Psychose (perte de contact avec la réalité).
- Agitation, nervosité, agressivité (sentiment de colère nouveau ou aggravé).
- Comportement inhabituel.
- Confusion mentale.
- Changements de l'humeur.
- Attaques de panique.
- Trouble de l'attention.
- Perte de mémoire pouvant parfois durer plus de 3 mois.
- Evanouissement.
- Crise d'épilepsie, convulsions.
- Augmentation transitoire des enzymes de votre foie.
- Affections du foie : hépatite (inflammation du foie), insuffisance hépatique (dysfonctionnement du foie), ictère (coloration jaune de la peau)
- Diminution ou une augmentation des globules blancs, diminution des globules rouges ou des plaquettes.
- Diminution de l'appétit.
- Neuropathie avec des signes tels que des fourmillements ou des picotements, un engourdissement, une sensation de brûlure ou une douleur, une faiblesse musculaire, une apparition ou aggravation de troubles de l'équilibre ou des tremblements au niveau des mains et des doigts.
- Difficultés à parler.
- Vision floue, éblouissements nocturnes ou autres troubles de la vue pouvant survenir avec un temps de latence pendant ou après le traitement.
- Troubles auditifs incluant des bourdonnements dans les oreilles ou des difficultés à entendre.

- Affections cardiaques : troubles du rythme cardiaque, palpitations (sensations que le cœur bat très vite), pouls irrégulier.
- Changements de la pression artérielle ou du rythme cardiaque.
- Bouffées de chaleur.
- Essoufflement, toux, difficultés à respirer, pneumonie, pneumopathie potentiellement d'origine allergique (inflammation des poumons grave et potentiellement mortelle).
- Eruption cutanée.
- Perte de cheveux.
- Réaction allergique, pouvant être légère à grave, voir potentiellement mortelle (anaphylaxie) avec des symptômes comme une difficulté à respirer, un gonflement de la langue, un œdème, des démangeaisons et une éruption cutanée importante.
- Syndrome de Stevens Johnson : affection potentiellement grave caractérisée par une éruption cutanée ou rougeur étendue accompagnée de cloques ou d'un décollement de la peau (desquamation), plus particulièrement autour de la bouche, dans la gorge, du nez, des parties génitales (ulcères) ou des yeux (conjonctivites) et potentiellement associée à des symptômes pseudo grippaux incluant de la fièvre.
- Douleur ou malaise dans la région supérieure de l'abdomen (dyspepsie)
- Une pancréatite (inflammation du pancréas) pouvant se manifester par des symptômes tels que des douleurs à l'estomac ou des douleurs abdominales.
- Episode intense de transpiration (hyperhidrose).
- Faiblesse musculaire.
- Crampes.
- Douleurs musculaires ou articulaires.
- Douleur thoracique.
- Fatigue.
- Fièvre ou frissons.
- Dysfonctionnement, insuffisance ou inflammation du rein révélé généralement lors d'un examen sanguin et pouvant éventuellement se traduire par une diminution du volume des urines, une altération de l'état général, une tension artérielle anormale, ou encore des douleurs abdominales ou lombaires.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet: www.an-sm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LARIAM 250 mg, comprimé sécable ? ↗

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser LARIAM 250 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ↗

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient LARIAM 250 mg, comprimé sécable ?

La substance active est:

Chlorhydrate de méfloquine 274,09 mg
(Correspondant à méfloquine 250 mg)

Les autres composants sont:

Copolymère de polyoxyéthylène et de polyoxypropylène, cellulose microcristalline, alginate de calcium et d'ammonium, amidon de maïs, lactose monohydraté, crospovidone, talc, stéarate de magnésium.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que LARIAM 250 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

LARIAM 250 mg, comprimé sécable est présenté sous forme de comprimé sécable conditionné sous plaquettes thermoformées de 6, 8 et 10 comprimés ou en tube de 100 comprimés.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

ROCHE
30, Cours de l'Île Seguin
92650 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

Exploitant

ROCHE
30, Cours de l'Île Seguin
92650 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

Fabricant

ROCHE
ZAC DE LA GARENNE
AVENUE FAIDHERBE
93110 ROSNY SOUS BOIS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.

[Retour en haut de la page](#) ↗

